



Problemstilling:	Mottak av COVID 19 pas.
Læringsmål:	<ul style="list-style-type: none">• Gjennomføre systematisk pasientundersøkelse (ABCDE) og iverksette relevante tiltak.• Demonstrere teamsamarbeid med fokus på kommunikasjon, samhandling og ledelse, smittevern.• Håndtere COVID 19 pas etter gjeldende retningslinjer og prosedyre mtp smittevern.• Øve kommunikasjonslinjer og transport innad på huset.
Briefing/ Pasientsituasjon:	<p>67 går gammel dame, Kari , som har vært i hjemmekarantene etter skiferie i Nord Italia for 15 dager siden. Pas har befunnet seg hjemme og ringt 113 etter at hun natt til i dag har opplevd tiltagende tungpust. Fra tidligere HT og DM2.</p> <p>Hentet av ambulanse og fått følgende prehospital behandling: -02 15l på maske. -Ringer infusjon på venekanyle, autoseponert under transport. -BS målt til 13,2.</p>
Kliniske Funn:	<p>A: Forsvarer egen luftvei, surklete respirasjon.</p> <p>B: Respirasjonsfrekvens 36/min. SpO₂: 86% på 15L, Pas er utslitt. Respirasjonslyd: Nedsatt lyd basalt bilat.</p> <p>C: Puls 135 . Bt 90/55 mmHg. Hud (varm, ingen synlige utslett) Sinusrytme. Blodgass: pH:7.2, pCo₂ 7.6, sO₂ 82%, HCO₃- 20, BE-6, Laktat 2.9, Na 135, K 5.8</p> <p>D: Sidelike pupiller som reagerer adekvat på lys. Glasgow Coma Scale: 12. E (3/4): Åpner øyne på kommando. V (4/5): Forvirret verbal respons. M: (5/6): Lokaliserer smerte.</p> <p>E: Hud varm, tørr. Ingen utslett. Tmp: 39.9.</p>
Forslag til korrekt behandling:	<ol style="list-style-type: none">1. Direkte transport til COVID-19 intensiv kohorte. LIS2 Med i Covid 19 inngang.2. Mottak iført smittevernutstyr på intensiv/oppvåkning.3. Gjennomføre pasientundersøkelse/behandling. (ABCDE) blodgass, IV tilgang, beslutte. respiratorbehandling, intubasjon). Casen avsluttes så snart respiratorbehandling er i gang. Da skal deltagerne for kle av smittevernutstyr hensiktsmessig.
Hva feiler pasienten?	Mistenkt COVID-19, ARDS.Respiratorkrevende.
Tilgjengelig utstyr:	Dukke/markør, ambulanse personell. Utstyr på Covid19 intensiv kohorte, inkl. smittevernutstyr. Transport av pas fra Covid 19 inngang til intensiv/akuttrom frem til intubasjon, akran, kateter og avkledning.