

# Simulering psykiatrisk klinikk

## Mottak av pasient med, eller med mistanke om coronasmitte

Rådgiver ved Senter for simulering og ferdighetstrening, Helse Bergen, RFM  
ferdighetssenteret@helse-bergen.no

### Læringsmål

Utføre korrekt smittehåndtering i mottak av pasient med mistanke om eller påvist coronasmitte.

### Utstyr tilgjengelig

- Smitteutstyr: frakk, munnbind, hansker, visir.
- Håndsprit og overflatesprit.
- Container for smitteavfall og vanlig buss.
- Metalldetektor (eller noe som likner)
- Plastbakke til oppbevaring av mobil og andre små eiendeler.

### Pasientbeskrivelse

Pasient med kjent psykoselidelse kommer til relevant psykiatrisk mottakspost (HBergen:Pam 1 (evt. til S1 eller S5)) med følge av psykiatriambulansen. Pasient kommer fra (Bergen) legevakt etter bekymringsmelding fra naboer der han bor da han har fremstått paranoid og forvirret siste tid. Pasient har hoste og vondt i kroppen. Temperatur er målt på (Bergen) legevakt til 38,3 C. Det er mistanke om coronasmitte og det er tatt test på (Bergen) legevakt for dette. På grunn av sin psykiske tilstand skal pasient innlegges i Psykiatrisk akuttmottak for vurdering. Pasient fremstår forvirret, men er ellers rolig og samarbeidsvillig. Han har på seg munnbind fra ambulansen.

### Situasjon

Pasient skal tas imot av sykepleier(e) og evt. behandler. Han skal levere fra seg eiendeler og spritte hender, deretter følges inn til pasientrom.

### For markører

Pasient skal fremstå moderat forvirret, men samarbeidsvillig. Han leverer fra seg det han har i lommer som er nøkler og mobiltelefon. Leverer også fra seg en sekk med eiendeler som han har med seg. Pasient berører flere flater før han får tatt på håndsprit. Han samarbeider deretter fint om å gå inn på rommet.

### For aktører

- Før pasient kommer, skal smittevernutstyr tas på etter smittevernprosedyre. Smittefrakk, hansker, munnbind og visir/briller.
- En person tar imot pasientens eiendeler og gjennomgår disse.
- En person tar ansvar for å få pasient til å spritte hender og deretter ta på munnbind og følger pasienten til rommet.
- Alle smitteverntiltak som er påkrevd skal gjennomføres etter at pasient er fulgt til rom.
- Personalet skal så ta av seg smittevernutstyr etter godkjent prosedyre før simuleringen avsluttes.